

MORTALIDAD INFANTIL, EN LA NIÑEZ, ADULTA Y MATERNA

La mortalidad perinatal, aquella ocurrida entre las 28 semanas de gestación (mortinatos) y los primeros 7 días de vida, **ha presentado una disminución progresiva en Colombia, pasando de 14,0 y 13,0 muertes por cada mil nacidos vivos** en las mediciones de 2010 y 2015, respectivamente, a una tasa de 3,9 muertes por cada mil en 2025 (reducción del 72,1 % respecto al 2010).



Se identificó una marcada sobrerrepresentación masculina: cerca de tres cuartas partes de las defunciones corresponden a hombres, y la tasa de mortalidad masculina casi triplica la observada en las mujeres. Este patrón es usual en Colombia y América Latina, donde los hombres jóvenes y adultos presentan mayor riesgo de muerte prematura, en especial por causas externas como homicidios, accidentes de tránsito y suicidios.



La ENDS 2025 estimó una tasa de mortalidad en personas de 15 a 49 años de 1,6 muertes por cada mil años-persona exposición en los seis años anteriores a la encuesta.




Desde el año 2000, la mortalidad en la niñez (menores de cinco años) se ha mantenido por debajo de la meta de 25 por cada 1.000 nacidos vivos establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio con miras al 2030.



Las tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez muestran una disminución sostenida en Colombia a lo largo de las últimas tres décadas en el país, sin embargo, se identifican importantes desigualdades sociales y territoriales que deben eliminadas.


Entre las ENDS 2015 y 2025:

La mortalidad neonatal se redujo en un




pasando de 9,0 a 1,2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

La mortalidad infantil se redujo en un



pasando de 16,0 a 5,2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

La mortalidad en la niñez se redujo en un



pasando de 25,0 a 6,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.



La mortalidad infantil concentra el **80,0 %**



de la mortalidad en la niñez en Colombia, es decir, la mayor parte de las muertes en menores de cinco años ocurre en los primeros 12 meses de vida.

La ENDS 2025 incorporó por primera vez la estimación de la mortalidad materna, en este sentido, se calculó una razón de mortalidad materna indirecta (o relacionada) de 64,5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en los seis años previos a la encuesta.