



Salud






ENDS ENCUESTA NACIONAL
DE DEMOGRAFÍA Y SALUD
2025

The image shows two women, likely health workers, in an outdoor setting. They are wearing white t-shirts with 'COLOMBIA' and 'Salud' logos, and grey baseball caps with 'UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA' and 'COLOMBIA' logos. They are looking at a clipboard held by the woman on the right. The background features a paved area, greenery, and a building with a red-tiled roof. A semi-transparent teal banner with white text is overlaid on the image.


Algunos resultados por región

Tenencia de las viviendas




Porcentaje de hogares en los quintiles de riqueza


Total hogares 42.561




Cobertura de la población por sexo a nivel nacional




Jefatura femenina de los hogares




Tamaño promedio de los hogares




Hogares unipersonales




Hogares con dos residentes habituales




Preferencias de fecundidad



Tasa global de fecundidad observada





Bienes de consumo con mayor disponibilidad




Asistencia de menores de 5 años a programas de atención dirigidos a niños y niñas

Los datos de la ENDS 2025 indican que en Colombia el **43,4%** de los niños y las niñas menores de 5 años asisten a programas de atención a la primera infancia.





Ocupación de mujeres de 13-49 años



- Trabajador(a) de sector servicios
- Comerciante o vendedor(a)
- Administrativo(a) o asistencial


Ocupación de hombres de 13-59 años




- Trabajador(a) de sector servicios
- Trabajador(a) agropecuario(a) o forestal, pescador(a), cazador(a)
- Comerciante o vendedor(a)

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Mujeres y hombres de 13-49 años

Mujeres




Hombres




Respuesta para tratar el problema de salud

8,2%

De las personas **presentaron un problema de salud en el último mes**, en 2015 esta proporción fue del **9,0%**




Razones por las que no recibieron atención médica




35,1%

De las personas que **presentaron un problema de salud en el último mes no recibieron atención médica**, en 2015 esta proporción fue del **35,4%**

Respuesta para tratar el problema de salud




Razones por las que no recibieron atención médica




Indicadores básicos de pobreza multidimensional




Hogares con bajo logro educativo




Hogares con analfabetismo



Indicadores básicos de pobreza multidimensional



Hogares con empleo informal



Inmigrantes venezolanos


4,6%

De la población encuestada en Colombia es inmigrante.



96,4%

De los inmigrantes en Colombia son de Venezuela




Migrantes internos por región

14,8%


53,4% son Mujeres
Hombres 46,6%

20 a 29 años
26,6% de la
población migrante
interna




Nupcialidad

Mujeres y hombres de 20 a 24 años con primera relación sexual antes de los 15 años




Nupcialidad

Mujeres y hombres de 20 a 24 años con primera unión antes de los 20 años




Educación integral para la sexualidad




Salud materna



Conocimiento consulta preconcepcional




Promedio de control prenatal




Salud materna


Lugar de atención del parto



Práctica de alguna prueba para la detección temprana del cáncer de cuello uterino




Vacuna contra el VPH




Práctica de acciones para prevención cáncer de seno


Autoexamen mujeres de 21 a 69 años



Mamografía mujeres de 40 a 69 años




Examen clínico del seno mujeres de 21 a 69 años




Práctica de acciones para prevención cáncer de próstata



Tacto rectal




Antígeno prostático específico



Práctica de acciones para prevención cáncer de testículo




Conocimiento sobre VIH/SIDA




Creencias practicas de alto riesgo VIH/SIDA

Mujeres




Hombres




- Tener relaciones sexuales sin condón aumenta el riesgo de adquirir el virus que causa el sida
- Es más probable que una persona no use condón si tiene relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol o las drogas
- Las parejas que se hacen la prueba del VIH y se protegen mutuamente tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el sida
- Tener otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes, chancro, aumenta el riesgo de adquirir el virus que causa el sida

Mujeres víctimas de algún tipo de violencia por la pareja




Mujeres víctimas de algún tipo de violencia por la pareja




Roles de Género y Autonomía Sexual y Reproductiva



Porcentaje de mujeres y hombres que consideran que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia




Aborto e IVE - Conocimiento de casos en que está despenalizado el aborto en Colombia




Imaginarios hacia la Población LGBT

Mujeres




Hombres




- Una persona de la población LGBTI puede ser buen padre o madre
- Una persona de la población LGBTI puede cuidar o trabajar con niño(a)s
- Es molesto ver dos hombres o dos mujeres que se besen en público
- Es molesto ver a un hombre con actitudes femeninas o a una mujer con actitudes masculinas
- Es mejor no tener vecinos(as) de la población LGBTI

Aborto e IVE - Conocimiento de casos en que está despenalizado el aborto en Colombia



- Las regiones que tienen mayor número de personas que se reconocen como víctimas afectadas por el conflicto armado fueron la Pacífica (24,7%), particularmente en el Chocó, con tres de cada cinco personas





Salud

